

پتیدین



ضد درد ، داروي کمکي در بیهوشي
مصرف در حاملگي:

گروه B

مکانیسم اثر:

اثر ضد درد: این دارو به گیرنده هاي اختصاصي خود در بسياري از نقاط CNS متصل شده و باعث کاهش احساس درد مي شود.

نیمه عمر: ۴ – ۲,۴ ساعت

دفع:

این دارو از راه کلیه دفع مي شود.

کنتراندیکاسیون ها:

دپرسیون تنفسي، کولیت سپودومامبرانو، اسهال ناشي از مسمومیت ها

موارد احتیاط:

آسم برونکیال حاد، بیماری هاي مزمن تنفسي، بیماری هاي شدید التهابي روده، انفارکتوس میوکارد، شکم حاد، دیس ریتمی هاي قلبي، سابقه تشنج، تمایل به خودکشي، جراحي اخیر دستگاه گوارش، تروما به سر، افزایش فشار انتراکرانیال، اختلال عملکرد کبد، هیپوتیروئیدیسم، هیپرتروفی خوش خیم، پروستات همراه با انسداد، اختلال عملکرد کلیه

تداخلات:

مصرف همزمان این دارو با دارو هاي تضعیف کننده دستگاه عصبی مرکزي (نارکوتیک ها، بیهوش کننده هاي عمومي، آنتی هیستامین ها، مهار کننده هاي منوآمین اکسید) دارو های ضد افسردگی مثل: ایزوکاربوکسازید ، فنلژین ، سلژیلین ترانیل سیپرومین)، فنوتیازین ها، باربیتورات ها، آرامبخش/خواب آور ها، دارو هاي ضد افسردگی سه حلقه اي و شل کننده هاي عضلانی باعث افزایش اثر تضعیف CNS و دپرسیون تنفسي این دارو مي گردد. در صورت مصرف همزمان این دارو با دارو هاي بیهوش کننده عمومي ممکن است دپرسیون قلبي – عروقي شدیدی ایجاد شود.

عوارض جانبی: بی خوابی،

سرخوشي، بی قراری، گیجی، سردرد، تومور، میوز، تشنج، کابوس هاي شبانه، وابستگی رواني، تاکی کاردی، آسیتول، برادی کاردی، سنکوپ، ادم، راش، خارش، درد در محل تزریق، خستگی دهان، بی اشتهايي، اسپاسم صفراوي، ایلئوس، تهوع، استفراغ، یبوست، دپرسیون

در صورت ایجاد واکنش افزایش حساسیت، تشنج یا دیس ریتمی های قلبی، مصرف دارو باید قطع شود.

جهت تزریق وریدی باید آمپول را حداقل در ۵cc آب مقطر یا نرمال سالین رقیق کرده و به آهستگی تزریق نمایید. تزریق وریدی داروی رقیق شده ممکن است منجر به افزایش ضربان قلب و سنکوپ شود.

علائم حیاتی بیمار را در هنگام تجویز دارو به دقت کنترل نمایید.

مصرف در شیر دهی:

این دارو در شیر ترشح می شود. بیمار بعد از مصرف دارو، حداقل تا ۳ - ۲ ساعت نباید به کودک خود شیر دهد.



آموزش به بیمار: مصرف دارو احتمالاً سبب خواب آلودگی و گیجی می گردد، به همین جهت به بیمار توصیه نمایید تا مشخص نشدن تأثیر دارو از رانندگی و سایر امور نیازمند هوشیاری پرهیز نماید.

توصیه می شود در جهت پیشگیری از بروز هیپوتانسیون وضعیتی از تغییر وضعیت ناگهانی پرهیز نمایید.

توصیه می شود که از مصرف همزمان سایر داروهای تضعیف کننده اعصاب مرکزی در هنگام درمان با پتیدین پرهیز نمایید.

به منظور پیشگیری از بروز آتلکتازی، بیمار را تشویق نمایید که هر دو ساعت یکبار مبادرت به انجام سرفه، تنفس عمیق و چرخش در تخت نماید.